

## **ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES DANS LES ÉCOLES** **(Références du B0 n° 1 du 06.01.2000)**

### **PRÉAMBULE**

L'organisation des soins et des urgences, définie en début d'année, inscrite au règlement intérieur, et portée à la connaissance des élèves et des familles prévoit :

- 1 – Une fiche d'urgence à l'intention des parents, non confidentielle, renseignée chaque année (page 20 du B.O.)
- 2 – Les modalités d'accueil dans l'école des élèves malades, accidentés ou atteints d'un handicap.
- 3 – Une ligne téléphonique accessible en permanence pour l'appel du SAMU (15 ou 112 sur portable (conseils de soins, transport).
- 4 – L'affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence
- 5 – Un registre spécifique où seront portés :
  - le nom de l'élève
  - la date et l'heure de l'intervention
  - les mesures de soins et d'urgence prises (informer la famille)
  - les éventuelles décisions d'orientation (retour dans la famille, prise en charge par les structures de soins)
- 6 – Une armoire à pharmacie fermant à clef placée en hauteur
- 7 – Une trousse de premiers secours pour les déplacements extérieurs.

### **CONDUITE À TENIR**

- 1 – Rassurer et isoler
- 2 – Ne pas dramatiser
- 3 – Ne pas minimiser
- 4 – Rester vigilant

**Dans tous les cas consulter la famille**  
**Alerter au moindre doute (SAMU tél. 15 ou 112 sur portable)**

## **CONSIGNES DE SOINS**

1 – Se laver les mains avant et après chaque soin utiliser de l'eau et du savon de Marseille liquide (distributeur de préférence) sécher les mains avec une serviette à usage unique (distributeur de préférence)

2 – Porter des gants jetables

3 – Ne pas utiliser :

- le coton parce qu'il adhère à la plaie
- les désinfectants colorés car ils masquent la plaie

4 – Désinfecter toutes les surfaces et le matériel ayant été en contact avec du sang :

- eau de javel diluée au 1/10ème
- laisser agir pendant 10 minutes
- rincer

5 – A l'internat, dans les restaurants scolaires, l'échange des brosses à dents, des rasoirs doit être évité pour des raisons d'hygiène évidentes.

## **PROTOCOLE D'ALERTE** **AU SAMU EN CAS D'URGENCE**

Face à une situation d'urgence, modalités d'intervention pour l'appel au SAMU (15) par tout adulte de la communauté éducative.

### **1 - OBSERVER**

- Le blessé ou le malade répond-il aux questions ?
- Respire-t-il sans difficulté ?
- Saigne-t-il ?
- De quoi se plaint-il ?

### **2 - ALERTER**

- Composer le 15

Indiquer l'adresse détaillée (ville, rue...)

Préciser le type d'événement (chute...)

Décrire l'état observé au médecin du SAMU

- Ne pas raccrocher le premier
- Laisser la ligne téléphonique disponible

### **3 - APPLIQUER LES CONSEILS DONNÉS**

- Couvrir et rassurer
- Ne pas donner à boire
- Rappeler le **15** en cas d'évolution de l'état

## SOINS QUOTIDIENS

### Plaie superficielle

- Nettoyer à l'eau et au savon puis désinfecter avec une compresse imbibée d'un antiseptique incolore (héxomédine solution à 1/00)
- Mettre un pansement
- Vérifier sur la fiche d'urgence si le rappel Tétanos est à jour

### Plaie profonde

- Rassurer
- Position allongée (ou assise si plaie au thorax)
- Ne jamais donner à boire
- Ne pas retirer un corps étranger
- Alerter le SAMU ☎ 15

### Saignement abondant (sans corps étranger, ni fracture ouverte)

- Position allongée ou assise si plaie au thorax
- Comprimer : c'est à dire appuyer très fort avec la main là où cela saigne avec plusieurs épaisseurs de compresses maintenues par un pansement ou mettre un pansement compressif prêt à l'emploi Ne pas relâcher la compression
- Alerter le SAMU ☎ 15

### Saignement de nez

- Faire moucher l'enfant
- Appuyer fortement sur les deux narines, élève assis, tête légèrement penchée en avant jusqu'à l'arrêt du saignement au moins pendant 5 minutes
- Si le saignement se prolonge au delà de 10 minutes  
Alerter le SAMU ☎ 15

### Brûlure thermique ou chimique

- Refroidir immédiatement sous l'eau courante jusqu'à disparition de la douleur, pendant 5 minutes au moins et protéger, par une compresse stérile, pas de pommade ni de corps gras
- Evacuer en cas de brûlure importante ou profonde, Alerter le SAMU ☎ 15

### Brûlure électrique

- Couper le courant
- Allonger
- Surveiller ventilation et pouls
- Alerter le SAMU ☎ 15

### Coups - contusion simple sans plaie

- Poser un coussin réfrigérant ou un sac de glace entouré d'un linge propre sur le point douloureux
- Etre prudent. **Penser à une fracture** : dans ce cas
  - Ne pas mobiliser
  - Alerter le SAMU ☎ 15

### Choc à la tête

- Surveiller : agitation, endormissement, vomissements sont les signes de gravité pouvant apparaître longtemps après, dans ce cas alerter le SAMU ☎ 15

### **Chute sur le dos**

- Vérifier l'état de conscience – Si inconscient, alerter le SAMU ☎ 15
- Si fourmillements ou paralysie au niveau des membres, ou douleur importante au niveau du dos, alerter le SAMU ☎ 15
- Ne pas mobiliser

### **Atteinte à l'œil**

- Toute blessure à l'œil est potentiellement grave et nécessite une consultation spécialisée, alerter le SAMU ☎ 15
  - En cas de projection de liquide, faire un lavage abondant à l'eau pendant 15 minutes
  - En cas de corps étranger : ne pas chercher à l'enlever

### **Malaise, évanouissement**

- Allonger sur le côté
- S'assurer que la victime respire librement
- Alerter le SAMU ☎ 15

### **Piqûre d'insecte**

- Désinfecter, puis refroidir
- Si les piqûres se situent à l'intérieur de la bouche ou si la victime est allergique : risque de réaction violente (gonflement, gêne respiratoire), alerter le SAMU ☎ 15

DANS TOUS LES CAS, PRÉVENIR LA FAMILLE

### **TROUSSE POUR DÉPLACEMENTS A L'USAGE DE TOUS LES PERSONNELS (tenir au frais)**

- Prévoir un téléphone mobile (Samu 112)
- Consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence
- Antiseptique (héxomédine à 1/00)
- Compresses
- Paire de ciseaux
- Pince à échardes
- Pansements adhésifs hypoallergiques - compressifs
- Sparadrap hypoallergique
- Bande, écharpe
- Gants jetables
- Compresses watergel

Médicaments concernant les enfants ayant un Projet d'Accueil Individualisé dans trousse spécifique (glacière)